

Nº: 26 / 2013 / DPS

Data: 04 / 07 / 2013

CIRCULAR NORMATIVA

Para: Instituições Hospitalares do SNS

ASSUNTO: Codificação Clínica – clarificação da codificação das situações de “Insuficiência Renal”

Clarificação da codificação das situações de “Insuficiência Renal” (1):

1. Insuficiência Renal

Assume-se que a situação descrita no manual ICD-9-CM sob a designação de “*acute renal failure*”, categoria 584.x, corresponde às designações habitualmente descritas nos processos clínicos como insuficiência renal aguda com indicação para utilização de técnica de substituição dialítica.

A insuficiência renal crónica codifica-se na categoria 585.x, “*chronic kidney disease (CKD)*” devendo ser seguidas as instruções da ICD-9-CM de combinação e de codificação múltipla sempre que a insuficiência renal crónica coexista com hipertensão arterial.

Nas situações clínicas designadas por “insuficiência renal crónica agudizada” dever-se-á distinguir a insuficiência da falência temporária. Na presença de falência temporária codificar-se-á 585.x e 584.x. Na ausência de critérios de falência utilizar-se-á apenas 585.x.

Exemplos

Caso 1

Insuficiência renal aguda – 593.9

Devida a desidratação – 276.51 (P)

- ✓ Utiliza-se a entrada do índice alfabético **Insufficiency** / renal / acute

- ✓ A desidratação deve ser selecionada como diagnóstico principal sempre que o seu tratamento seja o objetivo do internamento

Caso 2

ICC – 428.0 (P)

Insuficiência renal crónica – 585.9

- ✓ Utiliza-se a entrada do índice alfabético **Insufficiency** / renal / chronic

Caso 3

Cardiopatía hipertensiva, não especificada – 404.90 (P)

Insuficiência renal crónica – 585.9

- ✓ Utiliza-se a entrada do índice alfabético **Hypertension, hypertensive** / with ...
- ✓ A hipertensão com IRC codifica-se na categoria 403.xx
- ✓ Como está registada também cardiopatía hipertensiva a situação passa a codificar-se na categoria 404.xx (doença renal crónica e cardíaca hipertensiva)
- ✓ Não se codifica em separado nem a hipertensão (401.x) nem a hipertensão com IRC (403.xx) por estarem incluídas em 404.xx
- ✓ A especificação do estadio da IRC é feita com um código adicional (585.x)

Caso 4

Diabetes mellitus II descompensada com nefropatia diabética – 250.42 (P)

Hipertensão arterial (HTA) – 403.90

Insuficiência renal crónica agudizada – 585.9

- ✓ A IRC em doente com HTA tem código de combinação (403.xx)
- ✓ O código 585.9 é adicional (codifica-se depois) em relação a 403.90
- ✓ Não se acrescenta o código da “nefropatia diabética” (583.81) porque existe insuficiência renal crónica (a categoria 583 destina-se à nefropatia não especificada como aguda ou crónica).
- ✓ A agudização da IRC não se codifica por não ter havido necessidade de diálise.

Caso 5

Insuficiência renal crónica agudizada

Com indicação para técnica de substituição renal temporária – 584.9 + 585.9

Sem necessidade de técnica de substituição renal – 585.9

(1) Consenso da equipa de médicos codificadores e auditores colaboradores da DPS/ACSS.

O Presidente do Conselho Diretivo

(João Carvalho das Neves)